

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

Semana 08/2026 **(del 16 al 22 de febrero de 2026)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	8
I.3.1 Vigilancia virológica	8
I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS	11
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	14
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	14
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	15
II.2.1 Vigilancia virológica	15
II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad).....	16
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	20
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	20
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	23

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 08/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 202,1 casos/100.000h (236,8 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 08/2026, la tasa de síndrome gripal es de 1,5 casos/100.000 h (3 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,1 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 118,6 casos/100.000 h (138,4 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 08/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (2,5% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (1,3% en la semana previa) y 31,2% para VRS (17,7% en la semana previa). El proxy de gripe estima una tasa de incidencia de gripe de 0 casos por 100.000h (5,9 la semana previa), el de COVID-19 estima una tasa de incidencia de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (3,1 en la semana) y el de VRS estima una tasa de incidencia de infección por VRS de 63 casos por 100.000 hab (41,9 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 08/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 6,3 casos/100.000 h (8 casos/100.000 h en la semana 07/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >=80. Por sexo, la incidencia es superior en hombres..
- En la semana 08/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (4% en la semana previa), 1,6% para SARS-CoV-2 (2,7% en la semana previa), y 39,1% para VRS (24% en la semana previa). El proxy estima una tasa de hospitalización para gripe de 0 casos/100.000hab (0,3 en la semana anterior), de COVID-19 de 0,1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y de infección por VRS de 2,5 casos/100.000hab (1,9 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 08/2026, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 202,1 casos/100.000h (236,8 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1493,8 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 987,7/100.000h. Por sexo, en la semana 08/2026 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (225,4/100.000h vs 178/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7
2025-48	347,7	2.215,5	1.537,8	486,5	239,8	269,7	285,3	356,7
2025-49	411,3	2.318,1	1.536,7	587,2	295,2	337,6	347,8	417,6
2025-50	281,9	1.329,3	957,9	394,6	216,5	220,3	243,2	272,0
2025-51	475,1	2.254,5	1.759,2	644,0	353,0	390,9	438,3	471,4
2025-52	299,0	1.389,5	1.210,8	367,4	220,9	262,1	293,5	302,6
2026-01	286,2	1.565,5	827,6	198,1	237,4	300,0	364,0	418,2
2026-02	307,7	1.725,1	767,1	215,2	253,7	342,8	393,0	478,5
2026-03	355,6	1.764,2	1.228,1	342,3	260,5	376,3	425,4	523,3
2026-04	330,2	1.731,6	1.714,0	390,7	217,2	288,1	332,3	398,3
2026-05	283,3	1.676,3	1.314,0	369,8	191,0	243,5	254,9	309,5
2026-06	247,0	1.506,8	1.131,5	299,6	170,3	224,5	223,2	273,3
2026-07	236,8	1.705,6	1.033,2	297,1	159,9	210,1	223,7	258,2
2026-08	202,1	1.493,8	987,7	270,9	132,3	165,4	168,0	209,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

Provincia	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08
Almería	328,3	335,2	274,3	266,6	246,7	204,7
Cádiz	500,4	478,9	394,8	330,8	326,3	293,9
Córdoba	333,7	284,6	241,8	218,3	208,4	183,3
Granada	301,9	298,1	266,8	228,7	229,2	191,0
Huelva	321,6	306,3	242,5	219,1	197,1	183,1
Jaén	396,6	376,1	329,2	283,8	265,1	227,4
Málaga	260,3	229,7	209,3	192,3	193,4	141,9
Sevilla	383,9	344,8	298,3	247,3	227,1	203,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.


Provincia	Distrito	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08
Almería	Almería	357,0	350,2	316,3	308,3	288,1	227,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	262,2	268,9	194,5	183,4	182,8	164,3
Almería	Poniente de Almería	332,1	354,0	271,7	266,5	236,0	200,9
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	621,6	579,1	490,1	399,2	399,0	359,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	362,2	313,3	278,9	254,5	217,3	257,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	481,1	522,2	380,3	300,6	304,9	284,9
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	386,6	397,7	332,6	303,0	272,3	234,8
Cádiz	Sierra de Cádiz	489,8	399,5	310,0	244,9	317,9	242,3
Córdoba	Córdoba	273,2	218,1	211,3	178,4	181,2	150,6
Córdoba	Córdoba Norte	434,3	327,8	270,4	225,4	215,8	221,3
Córdoba	Córdoba Sur	335,1	275,3	219,3	224,4	205,3	175,6
Córdoba	Guadalquivir	433,2	457,1	354,3	308,3	284,4	264,7
Granada	Granada	330,3	339,0	273,1	253,1	241,0	202,7
Granada	Granada Nordeste	410,4	390,9	300,9	229,2	226,2	236,4
Granada	Granada Sur	247,6	246,2	200,7	201,4	186,7	116,4
Granada	Metropolitano de Granada	285,3	277,2	281,7	227,8	241,0	202,4
Huelva	Condado-Campiña	220,1	232,0	189,0	164,2	155,5	140,5
Huelva	Huelva-Costa	395,1	374,8	288,2	267,1	240,7	226,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	311,9	249,5	222,1	187,1	147,6	133,9
Jaén	Jaén	487,3	464,7	386,2	343,7	317,5	297,5
Jaén	Jaén Nordeste	162,5	151,1	137,1	103,5	104,1	85,1
Jaén	Jaén Norte	392,8	362,8	317,0	283,0	259,2	208,9
Jaén	Jaén Sur	619,9	606,5	568,5	473,6	446,8	363,0
Málaga	Axarquía	263,0	204,8	169,4	164,4	165,5	99,6
Málaga	Costa del Sol	144,6	131,9	106,2	107,1	109,0	89,6
Málaga	La Vega	253,2	173,0	178,4	134,2	134,2	109,9
Málaga	Málaga	377,7	343,4	323,4	292,2	298,1	212,0
Málaga	Serranía	175,2	125,9	144,2	85,8	74,8	78,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	256,1	242,5	226,5	218,2	202,3	148,5
Sevilla	Aljarafe	325,3	311,0	282,3	231,3	224,6	162,4
Sevilla	Sevilla	436,2	375,6	310,6	266,0	234,5	237,7
Sevilla	Sevilla Este	370,1	321,4	268,6	213,3	206,2	165,8
Sevilla	Sevilla Norte	346,4	317,1	293,1	229,2	204,1	196,7
Sevilla	Sevilla Sur	381,2	350,7	305,5	255,0	238,4	205,2

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 08/2026, la tasa de síndrome gripal es de 1,5 casos/100.000 h (3 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,1 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 118,6 casos/100.000 h (138,4 casos/100.000 h en la semana previa)


Nivel de intensidad de la epidemia de gripe (síndrome gripal). Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía





Tasas de COVID-19 (síndrome). Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



Tasas de incidencia de COVID-19 (síndrome) por grupo de edad. Temporada 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía








I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 08/2026 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 2350 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 857 virus: 618 virus de la **gripe (26%)**[617 tipo A(352 AH3, 194 A(H1N1)pdm09 y 71 ANS)) y 1 tipo B], 78 virus **SARS-Cov2 (3%)** y 161 **VRS (7%)**. En la semana 08/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (2,5% en la semana previa), 0% para SARS-Cov-2 (1,3% en la semana previa) y 31,2% para VRS (17,7% en la semana previa).






*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.



Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	1	3	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	2	7	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	0	8	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	121	17	0	4	3	0	8	2	5,8	6,6	1,7
2025-46	164	135	24	1	9	6	0	5	3	11,9	3,7	2,2
2025-47	172	150	28	1	13	11	0	2	1	16,7	1,3	0,7
2025-48	173	145	32	0	11	12	0	4	5	15,9	2,8	3,4
2025-49	259	201	88	7	34	39	0	2	6	39,8	1,0	3,0
2025-50	145	114	64	7	12	44	0	0	1	55,3	0,0	0,9
2025-51	352	292	169	24	33	98	0	4	10	53,1	1,4	3,4
2025-52	89	65	45	1	7	30	0	2	5	58,5	3,1	7,7
2026-01	91	72	37	4	5	25	0	2	1	47,2	2,8	1,4
2026-02	128	100	48	8	12	14	0	0	14	34,0	0,0	14,0
2026-03	172	147	82	7	17	37	1	1	19	42,2	0,7	12,9
2026-04	152	133	57	3	7	19	0	1	27	21,8	0,8	20,3
2026-05	106	85	30	1	4	4	0	0	21	10,6	0,0	24,7
2026-06	102	95	36	3	2	7	0	0	24	12,6	0,0	25,3
2026-07	101	79	17	0	0	2	0	1	14	2,5	1,3	17,7
2026-08*	38	16	5	0	0	0	0	0	5	0,0	0,0	31,2

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior



Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	100	21	21,0	0	0,0	11	11,0
1-4 a.	261	60	23,0	1	0,4	47	18,0
5-14 a.	425	192	45,2	6	1,4	27	6,4
15-44 a.	612	152	24,8	25	4,1	29	4,7
45-64 a.	609	137	22,5	24	3,9	29	4,8
65+ a.	343	56	16,3	22	6,4	18	5,2
Total	2.350	618	26,3	78	3,3	161	6,9

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26





Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	20	7	74	1	0	8	31
Cádiz	7	22	32	0	0	10	15
Córdoba	5	5	26	0	0	7	8
Granada	8	27	46	0	0	10	20
Huelva	3	15	24	0	0	2	7
Jaén	2	8	18	0	0	2	9
Málaga	11	26	61	0	0	20	29
Sevilla	15	84	71	0	0	19	42
Total	71	194	352	1	0	78	161

En la semana 08/2026 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 139 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 2 virus gripe A (2 AH3), 0 SARS-Cov-2 y 21 VRS (5 VRS tipo A, 11 VRS tipo B y 5 VRS no tipado).

I.3.2 Proxys (tasa de IRAs x positividad) de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 08/2026 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (5,9 la semana previa), la de COVID-19 de 0 casos por 100.000h (3,1 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 63 casos por 100.000 hab (41,9 la semana previa).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	121	7	8	2	5,8	6,6	1,7	13,8	15,7	4,0
2025-46	135	16	5	3	11,9	3,7	2,2	32,4	10,1	6,0
2025-47	150	25	2	1	16,7	1,3	0,7	48,7	3,8	2,0
2025-48	145	23	4	5	15,9	2,8	3,4	55,3	9,7	11,8
2025-49	201	80	2	6	39,8	1,0	3,0	163,7	4,1	12,3
2025-50	114	63	0	1	55,3	0,0	0,9	155,9	0,0	2,5
2025-51	292	155	4	10	53,1	1,4	3,4	252,3	6,7	16,2
2025-52	65	38	2	5	58,5	3,1	7,7	174,9	9,3	23,0
2026-01	72	34	2	1	47,2	2,8	1,4	135,1	8,0	4,0
2026-02	100	34	0	14	34,0	0,0	14,0	104,6	0,0	43,1
2026-03	147	62	1	19	42,2	0,7	12,9	150,1	2,5	45,9
2026-04	133	29	1	27	21,8	0,8	20,3	72,0	2,6	67,0
2026-05	85	9	0	21	10,6	0,0	24,7	30,0	0,0	70,0
2026-06	95	12	0	24	12,6	0,0	25,3	31,1	0,0	62,5
2026-07	79	2	1	14	2,5	1,3	17,7	5,9	3,1	41,9
2026-08*	16	0	0	5	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	63,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 08/2026 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 6,3 casos/100.000 h (8 casos/100.000 h en la semana 07/2026). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 128,4 seguido del grupo >=80(45,5). Por sexo, la incidencia 6,8 vs 6,2 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6
2025-48	8,6	48,1	15,1	1,1	2,5	12,0	22,9	63,1
2025-49	8,0	90,9	17,1	1,0	1,4	13,0	26,3	49,1
2025-50	13,2	117,7	36,1	3,1	3,3	15,9	37,8	87,4
2025-51	14,3	107,0	44,2	2,1	3,9	18,7	42,8	88,6



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	>=80 a.
2025-52	16,7	128,4	48,2	1,7	4,1	25,6	48,5	105,5
2026-01	19,6	144,4	33,1	2,5	4,4	29,9	64,1	131,0
2026-02	16,4	123,0	26,1	1,7	4,3	24,0	50,0	111,6
2026-03	15,7	123,0	38,1	1,1	3,0	18,9	47,0	125,0
2026-04	12,4	112,3	57,2	1,0	2,4	12,5	32,8	92,2
2026-05	12,4	187,2	46,2	2,1	2,4	16,4	29,4	82,5
2026-06	9,6	96,3	35,1	1,3	2,0	11,5	24,4	69,2
2026-07	8,0	90,9	15,1	0,6	2,2	10,0	21,4	58,8
2026-08	6,3	128,4	15,1	1,0	1,2	6,4	17,2	45,5

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

II.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1837 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 386 (21%) han sido positivas para gripe, 75 (4,1%) para SARS-CoV-2 y 279 (15,2%) para VRS. En la semana 08/2026, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (4% en la semana previa), 1,6% para SARS-CoV-2 (2,7% en la semana previa), y 39,1% para VRS (24% en la semana previa).









II.2.2 Proxys de hospitalización (tasa de IRAG x positividad)

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de hospitalización por covid19, gripe y VRS.

En la semana 08/2026, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000hab (0,3 en la semana anterior), la de covid19 de 0,1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de



2,5 casos/100.000hab (1,9 en la semana anterior).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	4	4	1	5,6	5,6	1,4	0,3	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	1	3	0	2,4	7,1	0,0	0,1	0,4	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	72	5	5	3	6,9	6,9	4,2	0,5	0,5	0,3
2025-48	84	9	3	7	10,7	3,6	8,3	0,9	0,3	0,7
2025-49	83	18	1	8	21,7	1,2	9,6	1,7	0,1	0,8
2025-50	125	35	4	12	28,0	3,2	9,6	3,7	0,4	1,3
2025-51	104	43	2	13	41,3	1,9	12,5	5,9	0,3	1,8
2025-52	112	45	1	16	40,2	0,9	14,3	6,7	0,2	2,4
2026-01	143	68	2	21	47,6	1,4	14,7	9,3	0,3	2,9
2026-02	137	52	2	33	38,0	1,5	24,1	6,2	0,2	4,0
2026-03	123	34	3	15	27,6	2,4	12,2	4,3	0,4	1,9
2026-04	102	18	0	35	17,6	0,0	34,3	2,2	0,0	4,3
2026-05	98	4	1	36	4,1	1,0	36,7	0,5	0,1	4,6
2026-06	111	11	1	35	9,9	0,9	31,5	1,0	0,1	3,0
2026-07	75	3	2	18	4,0	2,7	24,0	0,3	0,2	1,9
2026-08	64	0	1	25	0,0	1,6	39,1	0,0	0,1	2,5

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	158	15	9,5	4	2,5	69	43,7
6-11 m.	47	3	6,4	4	8,5	29	61,7
1-4 a.	129	11	8,5	3	2,3	79	61,2
5-19 a.	39	6	15,4	4	10,3	7	17,9
20-59 a.	256	58	22,7	13	5,1	11	4,3
60-69 a.	258	66	25,6	9	3,5	14	5,4
70-79 a.	377	97	25,7	11	2,9	29	7,7
>79 a.	573	130	22,7	27	4,7	41	7,2
Total	1.837	386	21,0	75	4,1	279	15,2

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 08/2026

En la semana 08/2026, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 411 casos/100.000 h (455 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 15,6 casos/100.000 h (16,4 casos/100.000 h en la semana previa), situándose por debajo del umbral epidémico y dejando una epidemia gripal desarrollada entre las semanas 47/2025 y 03/2026 con un pico de intensidad media. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 1,8 casos/100.000 h (1,7 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 271 casos/100.000 h (297,7 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 1,8% para gripe (4,4% en la semana previa), 2,1% para SARS-CoV-2 (0,8% en la semana previa) y 11% para VRS (15,4% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 7,4 casos/100.000 h (20 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 8,6 casos/100.000 h (3,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 45,2 casos/100.000 h (70,1 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2026					
	3	4	5	6	7	8
ANDALUCIA	355,2	327,3	280,6	244,9	234,8	200
ARAGON	648,0	624,6	521,8	545,6	491,5	465,8
ASTURIAS	616,8	541,5	467,7	456,3	426,5	357
BALEARES	614,8	603,6	608,6	567,2	535,2	473,5
CANARIAS	919,5	883,2	862,2	828,9	818,0	739,3
CANTABRIA	758,3	609,6	568,2	551,7	504,4	360,5
C. LA MANCHA	708,6	633,8	580,2	552,8	506,6	472,5
C. Y LEON	612,4	459,4	473,4	384,8	381,9	315
CATALUÑA	608,0	570,4	597,1	608,3	542,1	525,5
C. VALENCIANA	855,9	820,2	789,6	761,9	712,5	662,4
EXTREMADURA	374,8	283,1	236,9	274,0	256,9	148,4
GALICIA	242,4	208,5	183,9	163,5	155,1	127,1
MADRID	474,1	450,4	412,8	453,2	444,3	-
MURCIA	811,9	749,3	652,3	633,0	561,2	471,1
NAVARRA	750,2	676,6	614,9	586,5	557,7	484,7
P. VASCO	473,2	433,0	391,8	354,8	316,3	253,1
LA RIOJA	671,7	600,7	511,2	496,1	430,8	378,9
CEUTA	858,9	911,8	742,0	734,2	615,8	652
MELILLA	1.463,2	1.395,8	1.206,4	1.165,7	998,5	969,8
NACIONAL	573,6	529,2	499,7	487,0	455,0	411

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 08/2026, la tasa de hospitalización por IRAG es de 12,3 casos/100.000 h (13,2 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 2,3% para gripe (3,5% en la semana previa), 1% para SARS-CoV-2 (0,8% en la semana previa) y 21,7% para VRS (23,5% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,3 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por gripe presentan un 22,7% de neumonía, un 4,1% de admisión en UCI y un 6,3% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,1 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 22,9% de neumonía, un 4,8% de admisión en UCI y un 10,7% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 2,7 casos/100.000 h (3,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por VRS presentan un 14,7% de neumonía, un 8% de admisión en UCI y un 3,2% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2026					
	3	4	5	6	7	8
ANDALUCIA	16,9	13,3	13,4	10,3	8,6	7,3
ARAGON	15,1	13,1	8,6	8,3	8,5	10
ASTURIAS	23,5	10,7	15,3	13,3	8,5	14,7
BALEARES	24,4	19,5	20,8	18,8	19,4	16
CANARIAS	11,3	10,4	8,9	9,4	12	4,3
CANTABRIA	18,2	20,9	18,5	17,4	16,7	15,4
C. LA MANCHA	24,9	19,8	20,2	20,3	20,8	19,7
C. Y LEON	28,3	24,6	21,9	17,9	13,9	14,2
CATALUÑA	14,4	13,1	12,7	13,6	11,5	10,9
C. VALENCIANA	18,5	17,8	18,1	15,9	14,9	14,5
EXTREMADURA	31,4	32,5	22,1	16,7	17,9	13,7
GALICIA	39,9	28	26,5	28,8	24,4	21,9
MADRID	21,2	17,2	15,4	16,8	10,6	-
MURCIA	22,9	16,1	13,7	13,2	12,1	13,7
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	29,4	23,9	21	21,2	19,1	13,2
LA RIOJA	36,3	39,6	22,7	17,3	25,8	14
CEUTA	16	15,5	22,7	14,4	16,9	7,3
MELILLA	17,8	17,2	15,3	13,8	10,6	10,5
NACIONAL	20,8	17,3	16,2	15,4	13,2	12,3

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa


En la semana 07/2026, las tasas de síndrome gripal (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran por encima de los niveles basales en 19 de los 31 países y zonas de la Región Europea de la OMS que notifican datos esta semana.

Los indicadores regionales de gripe, tanto en atención primaria como secundaria, continúan descendiendo desde los elevados niveles observados a principios de la temporada, con claras disminuciones en todos los países, salvo en un pequeño número. El virus de la gripe A(H3) sigue siendo el virus circulante dominante en la Región, y los adultos de 65 años o más representan la mayor proporción de casos graves de gripe.


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 se mantienen en los niveles basales.

Los indicadores regionales del VSR se están estabilizando en niveles elevados en los centros de atención primaria, pero continúan aumentando en hospital. Existe una considerable variabilidad entre países en las fases de sus epidemias estacionales de VSR. La carga de enfermedad y el porcentaje de positividad se mantienen más altos en los niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>